

РАДИАЦИОННЫЙ РАСПАД МАССИВНОГО НЕЙТРИНО В ЗАМАГНИЧЕННОМ ЭЛЕКТРОН–ПОЗИТРОННОМ ГАЗЕ

В. Ч. Жуковский, П. А. Эминов, К. Г. Левченко, В. А. Вшивцев

(кафедра теоретической физики)

Вычислена вероятность радиационного распада массивного дираковского нейтрино $\nu_i \rightarrow \nu_j + \gamma$ в замагниченном электрон–позитронном газе. Показано, что в сверхсильном магнитном поле имеет место существенное увеличение скорости распада по сравнению со свободным процессом в среде.

Наличие массы у нейтрино и нарушение закона сохранения лептонного числа приводят к таким фундаментальным эффектам, как осцилляции и нестабильность нейтрино, изучение которых становится одним из главных направлений в современной физике элементарных частиц [1].

В настоящей работе теория радиационных эффектов в горячей и плотной среде в присутствии внешнего калибровочного поля [2] впервые используется для вычисления вероятности радиационного распада массивного нейтрино в замагниченном электрон–позитронном газе.

В стандартной модели Вайнберга–Салама–Глэшоу со смешиванием лептонов основной вклад в амплитуду процесса $\nu_i \rightarrow \nu_j + \gamma$ в контактном приближении можно представить в виде (подробнее см. [3, 4]):

$$S_{ij} = -i \frac{4eG_F}{\sqrt{2}} \int d^4x d^4x' \bar{\nu}_j(x) \text{Sp} [\gamma_\mu L G(x, x') \times \gamma^\alpha A_\alpha(x') G(x', x)] \gamma^\mu L \nu_i(x), \quad (1)$$

$$L = \frac{1}{2} (1 + \gamma^5).$$

Здесь $G(x, x')$ — временная функция Грина идеального электрон–позитронного газа в постоянном магнитном поле, определяемая формулой [2]:

$$G(x, x') = S_c(H, T = \mu = 0) + S_\beta(H, T, \mu), \quad (2)$$

где $S_c(H, T = \mu = 0)$ — обычная причинная функция Грина электрона в постоянном магнитном поле, а температурная часть временной функции Грина

$$S_\beta(H, T, \mu) = i \sum_{s, \varepsilon=\pm 1} \frac{\varepsilon \psi_s^{(\varepsilon)}(\mathbf{x}) \bar{\psi}_s^{(\varepsilon)}(\mathbf{x}')}{\exp[\beta(E_s - \varepsilon \mu)] + 1} \times \quad (3)$$

$$\times \exp[-i\varepsilon E_s(t - t')].$$

Суммирование в (3) проводится по всем квантовым числам s положительно–частотных ($\varepsilon = +1$) и отрицательно–частотных ($\varepsilon = -1$) состояний, $\psi_s^{(\varepsilon)}(\mathbf{x})$ — координатная часть решения уравнения Дирака в постоянном магнитном поле.

Заметим, что вакуумная часть вероятности распада $\nu_i \rightarrow \nu_j + \gamma$ в постоянном внешнем поле детально изучена в работах [3, 4], и в дальнейшем мы ее

опускаем, а матрицу смешивания в (1) полагаем единичной, поскольку здесь нас интересует возможная катализирующая роль эффектов конечной плотности и интенсивного внешнего поля.

Учитывая, что в современных моделях нейтронных звезд [5] кора звезды представляется в виде кристаллической решетки ионов, погруженной в сильно вырожденный электронный газ, а напряженность магнитного поля $H \gtrsim 10^{12} \div 10^{14}$ Гс, будем предполагать выполнеными следующие условия:

$$T \ll E_F = \mu(T = 0), \quad 2eH > \mu^2 - m^2,$$

$$H \gg H_0 = \frac{m^2}{e} \simeq 4,41 \cdot 10^{13} \text{ Гс}.$$

Физически два последних условия соответствуют ситуации, когда заполнен электронами среды только основной уровень с главным квантовым числом $n = 0$, а основной вклад в вероятность процесса дают их переходы в промежуточное состояние также с нулевым главным квантовым числом [6].

В результате из формул (1)–(3) для вклада эффектов конечной плотности в амплитуду распада $\nu_i \rightarrow \nu_j + \gamma$ в сверхсильном магнитном поле получаем следующее представление:

$$S_{if} = i \frac{(eH)(2\pi)^2}{\sqrt{q_0 \omega q'_0}} 4(eG_F) \sum_{\varepsilon=\pm 1, \xi=\pm 1} \int dp'_3 \theta(\mu - E'_0) \times$$

$$\times \exp \left[-\frac{k_\perp^2}{2eH} \right] \delta(q - q' - k) [\bar{\nu}(q') \gamma^\mu \times$$

$$\times L \nu(q)] e_\alpha(k) \left[\frac{F_\mu^\alpha}{k_0 - E'_0 + \varepsilon E_0} \Big|_{p_3=p'_3-k_3} - \right.$$

$$\left. - \frac{F_\mu^\alpha}{k_0 + E'_0 - \varepsilon E_0} \Big|_{p_3=p'_3+k_3} \right], \quad (4)$$

где

$$F^{\alpha\mu} = (C_2 - C_4)^2 (S_2 - S_4)^2 \left[g^{\alpha 0} g^{\mu 0} + g^{\alpha 3} g^{\mu 3} - \right.$$

$$\left. - g^{\alpha 0} g^{\mu 3} - g^{\alpha 3} g^{\mu 0} \right] + (C_2^2 - C_4^2) (S_2^2 - S_4^2) \times$$

$$\times \left[g^{\alpha\mu} + g^{\alpha 1} g^{\mu 1} + g^{\alpha 2} g^{\mu 2} + \varepsilon^{12\alpha\mu} \right], \quad (5)$$

$$E_0 = \sqrt{m^2 + p_3^2}, \quad E'_0 = \sqrt{m^2 + p'_3^2},$$

причем $C_2(S_2)$ — известные спиновые коэффициенты в решении уравнения Дирака для промежуточных состояний и электронов среды соответственно.

В формуле (4) нейтринный ток $j^\mu = \bar{\nu}(q')\gamma^\mu L\nu(q)$, причем $\bar{\nu}_j(q')$ — дираковски сопряженный биспинор конечного нейтрино с импульсом q' ($q'^2 = m_\nu^2$), $\nu_i(q)$ — биспинор начального нейтрино с импульсом q ($q^2 = m_\nu^2$), импульс излученного фотона $k = q - q'$, $e^\alpha(k)$ — вектор поляризации излучаемого фотона, а энергия Ферми связана с концентрацией электронов соотношением

$$n = \frac{eH}{2\pi^2} \sqrt{\mu^2 - m^2}.$$

В предельном случае нерелятивистского электронного газа, когда

$$\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - 1 \ll 1,$$

и нерелятивистского нейтрино ($|\mathbf{q}| \ll m_\nu$) из формул (4)–(5) для дифференциальной вероятности распада находим

$$dw = \frac{8(eH)^2(eG_F)^2 m_\nu}{\pi^6 q_0 q'_0} \left[\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - 1 \right] \times \\ \times \cos^4 \theta (1 + \cos \theta) \delta(q - q' - k) d^3 q' d^3 k, \quad (6)$$

где θ — угол между направлением импульса фотона и направлением магнитного поля.

Из (6) следует, что угловое распределение фотонов от радиационного распада нейтрино в замагниченному электронном газе, как и в вакуумном случае [7], пропорционально характерному множителю $(1 + l \cos \theta)$, где $l = +1$ для левых дираковских нейтрино и $l = 0$ для майорановских нейтрино. Для полной вероятности распада в единицу времени и в единице объема из формулы (6) находим

$$w = \frac{8}{5\pi^5} m_\nu \left[\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - 1 \right] (eH)^2 (eG_F)^2 = \\ = \frac{128}{5} \frac{m_\nu}{m^2} n^2 \alpha G_F^2, \quad (7)$$

где α — постоянная тонкой структуры, G_F — константа Ферми, m — масса электрона, n — концентрация электронов, а масса конечного нейтрино положена равной нулю.

Можно показать, что в случае релятивистского нейтрино и нерелятивистского электронного газа вероятность процесса содержит дополнительный по сравнению с (7) общий множитель, равный с точностью до главного коэффициента m_ν/E_ν , т.е. имеет место уменьшение вероятности процесса.

Отметим, что в сверхсильном магнитном поле вероятность радиационного распада массивного нейтрино $\nu_i \rightarrow \nu_j + \gamma$ в электронном газе не зависит от напряженности магнитного поля.

В рамках стандартной модели вероятность радиационного распада массивного нейтрино в электронном газе, но без учета влияния внешнего поля, была вычислена ранее в работах [8]. Приведенные в [8] оценки показывают, что для относительно малых масс нейтрино и большой плотности среды, а также при конечной температуре имеет место существенное увеличение вероятности процесса по сравнению с вероятностью распада в вакууме. Например, для покоящегося нейтрино в случае нерелятивистской вырожденной плазмы звезд скорость радиационного распада и отношение вероятностей распада в среде и в вакууме определяются формулами [8]:

$$\Gamma = \frac{\alpha G_F^2 n^2 m_\nu}{2m^2}, \quad (8)$$

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_v} = 10^{19} \left(\frac{1 \text{ эВ}}{m_\nu}\right)^4 \left(\frac{n}{10^{24} \text{ см}^{-3}}\right)^2,$$

где нейтрино в конечном состоянии считается безмассовым, а матрица смешивания, как и в (7) — единичной.

Наш результат (7), учитывающий одновременный вклад эффектов конечной плотности среды и сверхсильного магнитного поля в вероятность распада, превосходит (8) примерно в 50 раз. При этом зависимость вероятности процесса в сверхсильном магнитном поле от концентрации нерелятивистского электронного газа такая же, как и в свободном распаде.

Литература

- Герштейн С.С., Кузнецов Е.П., Рябов В.А. // УФН. 1997. **167**, № 8. С. 811; Козлов Ю.В., Мартемьянов В.П., Мухин К.Н. // УФН. 1997. **167**, № 8. С. 849.
- Борисов А.В., Вшивцев А.С., Жуковский В.Ч., Эминов П.А. // УФН. 1997. **167**, № 3, С. 241.
- Zhukovsky V.Ch., Eminov P.A., Grigoruk A.E. // Mod. Phys. Lett. 1996. A11. P.3113; Жуковский В.Ч., Григорук А.Е., Левченко К.Г., Эминов П.А. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1997. № 5. С. 62 (Moscow University Phys. Bull. 1997. No. 5).
- Васильевская Л.А., Геодзев А.А., Михеев Н.В. // Ядерная физика. 1994. **57**. С. 124.
- Липунов В.Н. Астрофизика нейтронных звезд. М., 1987.
- Лоскутов Ю.М., Скоблев В.В. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1976. № 4. С. 387 (Moscow University Phys. Bull. 1976. No. 4. P. 387).
- Боум Ф., Фогель П. Физика массивных нейтрино. М., 1990.
- Giunti C., Kim C.W., Lam W.P. // Phys. Rev. 1991. D43. P. 164. D'Olivo J.C., Nieves F.J., Pal B.B. // Phys. Rev. Lett. 1990. **64**. P. 1088.

Поступила в редакцию
22.12.97